



11° CONGRESSO NAZIONALE
ICAR
Italian Conference on
AIDS and Antiviral Research

5-7 GIUGNO 2019
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO



Promosso da
SIMIT

è da
ISS Istituto Superiore di Sanità
AMCLI Associazione Microbiologia Clinica Italiana
SICA Società Italiana di Immunologia, Serologia Clinica e Allergologia
SIMIST Società Interdisciplinare per lo Studio della Malattia Sessualmente Trasmissibile
SITA Società Italiana per lo Studio Anticorpale
SIV-IVV Società Italiana di Virologia - Italian Society for Virology

ANLAIDS Associazione Nazionale per lo Studio dell'AIDS
ARCIGAY Associazione LGBT Italiana
Episc. Onlus Associazione Episcopale Onlus
LEA Lega Italiana per la Lotta contro l'AIDS
MAISIO MIEEL Consiglio di Cultura Omosessuale
NADIE Associazione Nazionale Onlus
NPS Italia Onlus Gruppo Nazionale Sinagoga
PLUS Onlus Federazione LGBT sinagoga Onlus



A survey as an opportunity for education on U=U in PLWHIVA

Authors: G.Orofino, S.Patrucco, G.L.Cipero, A.Perziano, C.Owen, P.Altini, M.Gay, R.Angilletta

UNDETECTABLE = UNTRANSMITTABLE



www.uequalsu.org
#UequalsU

Dott.ssa Annalisa PERZIANO,
Psicologa Clinica,
Volontaria per Associazione Arcobaleno AIDS Torino

Dichiaro di non avere potenziali Conflitti di Interesse

QUESTIONARIO

Età: _____ data della compilazione: ____/____/____

titolo di studio:

nessun titolo licenza elementare media inferiore media superiore laurea

nazionalità: _____

sesto: M F Transgender

orientamento sessuale: Eterosessuale sì no Omosessuale sì no Bisessuale sì no

Da quanti anni esegue la cura anti HIV (terapia antiretrovirale) ? _____

Ha mai sentito la espressione U = U ? sì no

Se sì :

in che occasione ? _____

chi gliene ha parlato ? _____

cosa significa U = U ? _____

secondo lei, una persona HIV + in trattamento antiretrovirale e con carica virale costantemente non rilevabile o < 20 copie, può contagiare un'altra persona attraverso rapporti sessuali NON protetti ?

sì no

secondo lei, una persona HIV + in trattamento antiretrovirale e con carica virale costantemente non rilevabile o < 20 copie, può contagiare un'altra persona attraverso lo scambio di una siringa, nella pratica tossicomanaica ?

sì no

secondo lei, una donna HIV + in gravidanza, in trattamento antiretrovirale e con carica virale costantemente non rilevabile o < 20 copie può contagiare il figlio che nascerà ?

sì no

ha mai parlato con il suo medico su questo tema, cioè che una persona HIV + in trattamento antiretrovirale assunto con regolarità, con carica virale costantemente non rilevabile o < 20 copie non trasmette la infezione da HIV, anche con rapporti sessuali NON protetti ? sì no

se sì, cosa le è stato detto ? _____

quello che le è stato detto, ha influenzato i suoi comportamenti di prevenzione? sì no

in che maniera (per esempio, utilizzo del condom nei rapporti sessuali) ? _____

Quello che le è stato detto, ha influenzato la sua qualità della vita (per esempio, il sapersi NON o MENO contagioso, la fa stare meglio, etc.) ? _____

se no, pensa di chiederlo in futuro al suo medico ? sì no

pensa che le altre persone HIV +, alla notizia che " una persona HIV + in trattamento antiretrovirale assunto con regolarità, con carica virale costantemente non rilevabile o < 20 copie non trasmette la infezione da HIV, anche con rapporti sessuali NON protetti ", cambierebbero i loro comportamenti preventivi ?

in che maniera ? _____

"Pensa che le persone, alla notizia che una persona HIV+ in trattamento antiretrovirale assunto con regolarità, con carica virale costantemente non rilevabile, non trasmette l'infezione HIV, cambierebbero i loro comportamenti preventivi? sì no

In che maniera? _____

Cambierebbero atteggiamento nei confronti delle persone HIV+? sì no

in che maniera? _____

grazie per la collaborazione

METHOD:


An anonymous questionnaire was administered to outpatients treated in 2 regional clinics and 2 community centres in the Piedmont region, from 15 January to 15 May 2019.

All the respondents are Italians or Italian speakers.


RISULTS:

- 222 questionnaires
- Mean age: 47 years (20-72 years)
- 167 males, 51 females, 1 transgender, 3 non responders
- 111 heterosexuals, 91 homosexuals, 17 bisexual, 3 non responders
- On ART for an average of: 11 years (6 months – 32 years), 1 person from birth
- Education: secondary and upper: 148; 1 no education at all; 4 non responders


HAVE YOU EVER HEARD ABOUT U=U?




WHO DID YOU HEAR ABOUT U=U FROM?




DO YOU THINK THAT PEOPLE WHO KNOW ABOUT U=U MAY CHANGE THEIR ATTITUDE TO PLWHIVA?



How has U=U effected the Quality of Your Life?



How do you think that PLWHIVA who know about U=U may change their preventive behaviours?



RESULTS show that U=U, both the slogan and its meaning, is mostly unknown by PLWHIVA in Italy. Should it be adapted in a more effective way?

This survey confirms that informational/educational/ awareness campaigns are needed by HIV+ people, who behave quite prudently (condom is widely used), but their awareness must be raised to let them choose their sexual behaviours more consciously.

UNDETECTABLE = UNTRANSMITTABLE



ARCIBALENO AIDS
partita di +